

統計法に基づく国の 統計調査です。調査 票情報の秘密の保護 に万全を期します。

令和4年国民健康•栄養調査

<u>資料 3-2</u>

R4. 4. 11

令和4年国民健康・栄養 調査企画解析検討会

身体状況調査票(案)

地区番号	市郡番号
世帯番号	世帯員番号
性別 1 男 2 女	
年齢 (令和4年11月1日現在)	都道 府県 保健所
[身体計測]	[問診] (20歳以上)
(1)身長 (1歳以上) cm	(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれた ことの有無(「境界型である」、「糖尿病の気がある」、 「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などの
(2)体重 (1歳以上) kg	ようにいわれたことも含む)
(3)腹囲	<u>1 有</u> 2 無 →(8)へ
(20歳以上) cm (へその高さ) h測方法	▼ (7-1)現在の糖尿病治療の有無 (通院による 定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)
1 調査員が測定 2 被調査者が測定(自己申告)	<u>1</u> 有 2 無 →(7-3)へ
(4) 血圧(20歳以上) 1回目	(7-2)現在の投薬(インスリン注射または血糖を 下げる薬)の有無
収縮期(最高) 拡張期(最低)	1 有 2 無
mmHg mmHg	(7-3)現在の生活習慣の改善の取り組みの有無
2回目 収縮期(最高) 拡張期(最低)	1 有 2 無
TABLEY (4)	1 11 2 ///
mmHg mmHg	(8)現在、医師等からの運動*禁止の有無
(5)血液検査実施の有無(20歳以上) (検査項目は裏面に記載)	1 有 2 無
_ 1 有_ 2 無	(9)運動 [※] 習慣
◆ 食後時間(裏面参照)	(医師等から運動を禁止されている((8)で「1 有」と 回答した)者は記載不要)
[問診](20歳以上)	(a) 1週間の運動日数 日 日
(6)現在、aからeの薬の使用の有無	
(a) 血圧を下げる薬 有・無	(b) 運動を行う日の平均運動時間
(b) 脈の乱れに関する薬 有・無	時間 分
(c) コレステロールを下げる薬 有・無	
(d) 中性脂肪(トリグリセライド) 有・無 を下げる薬	(c) 運動の継続年数 1 1年未満 2 1年以上
(e) 貧血治療のための薬(鉄剤) 有・無	

※運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の 維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うもの。

血液検査項目

1	血色素量
2	ヘマトクリット値
3	赤血球数
4	白血球数
5	血小板数
6	血糖値
7	ヘモグロビンA1c
8	総コレステロール
9	HDLーコレステロール
10	LDLーコレステロール
11	中性脂肪(トリグリセライド)
12	総たんぱく質
13	アルブミン
14	クレアチニン
15	血清鉄
16	TIBC(総鉄結合能)
17	AST(GOT)
18	ALT(GPT)
19	$\gamma - GT(\gamma - GTP)$
20	尿酸

「食後時間」には、直前に飲食した時刻(食事を開始した時刻)から採血までの経過時間について、 該当番号を記入する。直前の飲食とは、糖分を含む飲食物を摂取した場合である。

- ① 約30分 ⑤ 約4時間
- ② 約1時間 ⑥ 約5~6時間
- ③ 約2時間
- ⑦ 約7~8時間
- ④ 約3時間
- ⑧ 8時間以上